



CAMPAGNA DI PREVENZIONE DELL'EPATITE C

- *Centinaia di migliaia di persone in Italia ignorano di avere l'Epatite C*
- *L'Epatite C è per lo più asintomatica e lo screening è fondamentale*
- *Oggi, con le nuove terapie, puoi debellare l'Epatite C in 8 settimane*

Se nel corso della vita hai avuto almeno uno dei comportamenti a rischio elencati di seguito, sottoponiti ora al TEST GRATUITO SULLA SALIVA sul nostro Camper
Un team di epatologi ti accoglierà il giorno 29 Aprile 2018, Piazza B. Longo - Pompei (NA)

Gruppi per i quali è raccomandato lo screening per l'Epatite C



CATEGORIE A RISCHIO DI INFEZIONE DA HBV O HCV:

- Tossicodipendenti (attivi o che lo siano stati in passato)
- Consumatori di droghe per via inalatoria
- Categorie a rischio di esposizione a HBV o HCV:
 - Emodializzati
 - Persone sottoposte a procedure invasive mediche, odontoiatriche o estetiche (tatuaggi) in ambienti a basso standard di sterilizzazione dello strumentario
 - Personale sanitario
 - Persone emotrasfuse o sottoposte a trapianto d'organo prima degli anni '90
 - Emofilici che abbiano ricevuto emoderivati prima degli anni '90
 - Familiari e partner sessuali di soggetti con infezione da HBV/HCV
 - Bambini nati da madri con infezione da HBV o HCV
 - Ex Detenuti
 - Soggetti con infezione da HIV
 - Soggetti con attività sessuale promiscua o con precedenti malattie sessualmente trasmesse
 - Immigrati provenienti da aree ad alta endemia di infezione da HBV/HCV*

Accanto a queste categorie, la ricerca dei virus dell'epatite B e C deve essere effettuata nei soggetti con:

- Transaminasi alterate in almeno 2 occasioni
- Malattia epatica da altra causa (alcol, sindrome metabolica, malattie autoimmuni)
- Donne in gravidanza
- Prima di intraprendere trattamenti con farmaci immunosoppressivi